



PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA WARZYW LIŚCIOWYCH

(sałata, endywia, cykoria, roszonka, szpinak,
rukola, eskariola, boćwina, rukieta, itp.)



Faza rozwoju	Podjęmowane działanie	Mineral™	Roztwór
Bezpośrednio po wysiewie lub przesadzeniu sadzonek.	Podlewanie gleby wokół roślin. Powtarzać co 10 dni. W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
14 dni po wykiełkowaniu lub 7 dni po rozsadzeniu.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie raz na 10-14 dni do dojrzewania.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
15 dni po wykiełkowaniu lub 8 dni po rozsadzeniu.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie raz na 10-14 dni, zawsze dzień po Mineral™ Żółty.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pojawienia się pierwszych oznak choroby.	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...).		ok. 7% 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pojawienia się pierwszych oznak szkodników.	Lecznico: Opryskiwanie. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Żółty. Należy odczekać 24-48 godzin pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony.		ok. 7% 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody