




# PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA WARZYW OWOCOWYCH (pomidory, papryka, bakłażan, ogórek, dynie, arbuzy, melon itp.)



Faza rozwoju	Podjęmowane działanie	Mineral™	Roztwór
Bezpośrednio po wysiewie lub przesadzeniu sadzonek.	<b>Podlewanie gleby wokół roślin.</b> Powtarzać co 10 dni. W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.		<b>ok. 4%</b> 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
14 dni po wykiełkowaniu lub 7 dni po rozsadzeniu.	<b>Zapobiegawczo: Opryskiwanie</b> wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie co 7 dni do dojrzewania.		<b>ok. 4%</b> 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
15 dni po wykiełkowaniu lub 8 dni po rozsadzeniu.	<b>Zapobiegawczo: Opryskiwanie</b> wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie co 7 dni, zawsze dzień po Mineral™ Żółty.		<b>ok. 4%</b> 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
<b>W PRZYPADKU:</b> pojawienia się pierwszych oznak choroby.	<b>Lecznico: Opryskiwanie</b> wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...).		<b>ok. 7%</b> 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody
<b>W PRZYPADKU:</b> pojawienia się pierwszych oznak szkodników.	<b>Lecznico: Opryskiwanie.</b> Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Żółty. Należy odczekać 24-48 godzin pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony.		<b>ok. 7%</b> 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody