



PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA WARZYW KRZYŻOWYCH

(kapusta, kapusta włoska, kietki brukselki, kalafior, brokuty, kapusta chińska, kalarepa, część nadziemna kalarepy, rzepa, rzodkiew, rzeżucha, itp.)



Faza rozwoju	Podjęmowane działanie	Mineral™	Roztwór
Bezpośrednio po wysiewie lub po przesadzeniu sadzonek.	Podlewanie gleby wokół roślin. Powtarzać co 10 dni. W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.	ZIELONY Mineral™	ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
14 dni po wykiełkowaniu lub 7 dni po rozsadzeniu.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie co 7 dni do dojrzewania.	ŻÓŁTY Mineral™	ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
15 dni po wykiełkowaniu lub 8 dni po rozsadzeniu.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać regularnie co 7 dni, zawsze dzień po Mineral™ Żółty.	CZERWONY Mineral™	ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pierwszych oznak choroby.	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...).	ŻÓŁTY Mineral™	ok. 7% 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pojawienia się pierwszych oznak szkodników.	Lecznico: Opryskiwanie. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Yellow. Należy odczekać 24-48 godzin pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony.	CZERWONY Mineral™	ok. 7% 70 ml / 1 L wody 0,7 L / 10 L wody 7 L / 100 L wody