



PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA ZIEMNIAKÓW

(ogrodnicy i drobni hodowcy ekologiczni powinni zapoznać się z tabelą w wytycznych dotyczących ilości Mineral™)



Faza rozwoju	Podejmowane działanie	Mineral™	Roztwór
Przed sadzeniem lub bezpośrednio po sadzeniu i przed przykryciem nasion ziemniaka ziemią.	Namoczyć (najlepiej) przez 30 minut lub spryskać nasiona ziemniaka.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 2% 20 ml / 1 L wody 0,2 L / 10 L wody 2 L / 100 L wody
Bezpośrednio po sadzeniu.	Podlewanie , jeśli technologia pozwala, namoczyć glebę 10 000 L czystej wody/ha, przed podlewaniem Mineral™ Zielony. Nie nadaje się do gleb piaszczystych. W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.	ZIEŁONY Mineral™	ok. 4% 20 L / 500 L wody / ha
14 dni po wykiełkowaniu.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtórzyć po 10 dniach.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 4% 8-12 L / 200-300 L wody / ha
W okresie najbardziej intensywnego wzrostu, w przypadku odmian kwitnących do zakończenia kwitnienia.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtarzać regularnie raz w tygodniu.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 4% 12-20 L / 300-500 L wody / ha
W przypadku pojawienia się pleśni ziemniaczanej (serwis doradczy Phytophthora) lub w warunkach dużej wilgotności w temp. 18 °C do 26 °C.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtarzać co trzeci dzień, dopóki nie ustąpią objawy zakażenia.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 5% 15-25 L / 300-500 L wody / ha
W okresie najbardziej intensywnego wzrostu, w przypadku odmian kwitnących do zakończenia kwitnienia lub do końca wzrostu krzaka.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtarzać regularnie raz w tygodniu na wszystkich nadziemnych częściach rośliny, włącznie z kwiatostanami, zawsze jeden dzień po opryskiwaniu Mineral™ Żółty.	CZERWONY Mineral™	ok. 4% 12-20 L / 300-500 L wody / ha
Do momentu rozpoczęcia żółknięcia krzaka, faza pęcznienia bulw.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Dwukrotnie w przeciągu 10 dni.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 4% 8-12 L / 200-300 L wody / ha
W PRZYPADKU: pierwszych oznak choroby (Phytophthora infestans, Alternaria solani itp.)	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Hodowcy rynkowi powinni od początku stosować odpowiednie fungicydy.	ZÓŁTY Mineral™	ok. 8% 24-40 L / 300-500 L wody / ha
W PRZYPADKU: pojawienie się pierwszych szkodników lub w momencie wylęgania larw (Leptinotarsa decemlineata).	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Żółty. Należy odczekać 24-48 godzin pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony. Hodowcy rynkowi powinni stosować odpowiednie insektycydy.	CZERWONY Mineral™	ok. 8% 24-40 L / 300-500 L wody / ha