



PROGRAM RAMOWY MINERAL™ DLA OWOCÓW ZIARENKOWYCH (jabłko, gruszka, pigwa)



Faza rozwoju

Podjęmowane działanie

Przygotowanie gleby do wsadzenia sadzonek lub na początku wegetacji w przypadku drzewek dwuletnich lub wieloletnich.

Podstawowe nawożenie lub dodatkowe nawożenie nawozami organicznymi lub mineralnymi (NPK).

Faza rozwoju	Podjęmowane działanie	Mineral™	Roztwór
Bezpośrednio po przesadzeniu sadzonek lub na początku okresu wegetacji (kietkowanie).	Podlewanie gleby w obrębie obwodu korony drzewa dwukrotnie w przeciągu 14 dni. W przypadku młodych roślinek ponownie na początku okresu suszy. W kolejnych fazach rozwoju roślin zalecamy regularne stosowanie Mineral™ Zielony raz na 2 tygodnie.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
Faza 3-4 liści, przed kwitnieniem, podczas kwitnienia, po kwitnieniu do czasu zbiorów.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtarzać regularnie co 10-14 dni.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
Faza 3-4 liści, przed kwitnieniem, podczas kwitnienia, po kwitnieniu do dojrzewania owoców.	Zapobiegawczo: Opryskiwanie. Powtarzać regularnie co 10-14 dni, zawsze jeden dzień po opryskiwaniu Mineral™ Żółty.		ok. 4% 40 ml / 1 L wody 0,4 L / 10 L wody 4 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pojawienia się pierwszych oznak choroby (świerzb, mączniak prawdziwy, itp.).	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). W przypadku mączniaka, przed wykonaniem oprysku Mineral™ Żółty - oberwać zarażone pąki, usunąć je i spalić. W przypadku zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) i brunatnej zgnilizny drzew (Monilinia Laxa), przed wykonaniem oprysku Mineral™ Żółty - usunąć wszystkie zarażone gałęzie z liśćmi i kwiatami oraz je spalić. Hodowcy rynkowi powinni od początku stosować odpowiednie (systemowe) fungicydy wraz z Mineral™ Żółty, ale nie w tym samym kanistrze.		ok. 8% 80 ml / 1 L wody 0,8 L / 10 L wody 8 L / 100 L wody
W PRZYPADKU: pojawienia się pierwszych oznak szkodników (mszyce, miodówka gruszkowa, itp.).	Lecznico: Opryskiwanie wszystkich nadziemnych części rośliny. Powtarzać co najmniej 3 razy co drugi dzień (dzień 1, 3, 5 ...). Nie opryskiwać jednocześnie z Mineral™ Żółty. Należy odczekać 24-48 godzin pomiędzy wykonaniem oprysków Mineral™ Żółty i Mineral™ Czerwony. Przed wykonaniem oprysku Mineral™ Czerwony - oberwać zaatakowane pąki wraz z wszami, usunąć je i spalić. Jeśli przekroczony zostanie próg szkodliwości ekonomicznej (EDT) hodowcy rynkowi powinni stosować odpowiednie insektycydy.		ok. 8% 80 ml / 1 L wody 0,8 L / 10 L wody 8 L / 100 L wody